


凤仙花栽培技术



凤仙花栽培技术

，向外延伸成距。花瓣5枚，有两对合生，似3片，或重瓣，有白、粉、红、紫或杂色，有时花瓣有条纹和斑点。花期6~10月。

蒴果尖卵形，种子圆形，黄褐色，成熟时易自行爆裂。

凤仙花性喜热畏寒，适应性强，能自播繁殖。全草可入药，花主治蛇伤、腰


肋引痛;根和叶能散血通经。

现在花市上大部分是新几内亚凤仙，新几内亚凤仙为凤仙花科凤仙花属多年生常绿草本植物。花色丰富

、色泽艳丽欢快，四季开花，花朵繁茂，花期长;植株丰满，叶片洁净

秀美，叶色叶形独具特色;生长速度快、可自然成型，宜作周年供应的

时尚盆花。



生长条件

理想的营养生长温度是白天22℃~25℃ 夜间20℃~21℃;5

周后对于高大植株白天24℃~26℃夜间18℃，对于紧凑植株白天20℃

~21℃夜间18℃;18℃的夜温是花的分化和发育的理想温度，特别是在

低光照下;白天温度超过28℃~29℃，应当遮阴，否则会减小花的大小

。温度低于15℃或高于32℃将影响正常生长。需光照充足，但在夏季

需遮挡强光照。



栽培技术

成品花通常种植在10~15cm的花盆中;基质应疏松透气，

并有一定的保水性。对盐害非常敏感，宜薄肥勤施。避免浇水过多或干

旱。最适PH值为5.8~6.5。为了使植株造型丰满，应进行摘心整形。



e7LOTQ.jpg /></p> <p>施肥与浇水</p> <p>前三周用50~100ppm氮肥，随后三周用100ppm氮肥，然后根据土壤分析施肥，每两周后浇水一次避免盐害产生，扭曲、深绿并卷曲的叶子是太高盐分的信号，缓释肥和微肥的应用经常导致中毒。</p>

<p></p>

<p>病虫害防治</p> <p>病害主要是灰霉病、腐霉病、丝核菌和粉霉病，低盐和适量浇水可避免腐霉病。虫害：开花前应时刻注意蓟马、蜘蛛(生长点卷曲)和真菌蚊子的防治，否则花期杀虫剂的应用会影响花的发育，用35盎司/100GAL的药溉根可防治真菌蚊子。</p> <p></p>

<p>注意事项</p> <p>栽培中易出现的问题主要表现在开花延迟或无花：缺少光照、夜温过高(高于20°C)、氮肥用量过高，以上三种原因常常同时存在;不生根或最初不生长，根腐、基质太湿，并经常温度低(低于20°C)、有时盐分过高;如果只有部分植物不生长，真菌、蚊子可能是一个原因。花不育或花少：通常由低光和高夜温(20°C以上的夜温)造成，同时出现更严重;高氮肥，特别是高氨态氮肥也会造成，以上情况同时出现会更严重。</p>

</DIV><p>下载本文pdf文件</p>