

马铃薯春季田管技术 这些方法掌握住

确保出苗整齐。露地种植的马铃薯在雨后土壤表面结壳后，要打破土表硬壳以利出苗；地膜覆盖栽培的马铃薯要及时破膜引苗，并用细土封住膜孔，以利于提升地温和防止烧苗；高山区域还没有完成播种工作的要督促加快播种进度，力争在3月1日前完成播种工作，以利出苗整齐形成高产壮苗，为马铃薯丰产奠定基础。及时清沟理水。马铃薯怕渍，春季雨水较多，应及时理沟排渍，确保雨住田干，防止渍水烂薯造成严重减产甚至失收。早培土、培高垄。马铃薯培土可使植株埋入土下节数增多，增加匍匐茎的数量，形成更多和更大的块茎，并防止块茎见光致薯皮发青。防止冻害。在霜冻来临前用稻草、杂草、搭建小拱棚进行覆盖防霜，待冷空气或晚霜过后及时揭除；霜冻后及时清除冻死的地上植株、老叶和死叶，喷施70%甲基托布津800-1000倍或75%百菌清600-800倍药液防止发病，在植株发出新茎新叶后，每亩用磷酸二氢钾200克兑水60千克喷施叶面1-2次，促进植株生长。注意病虫害防治。有晚疫病预测预报条件地区，按照预警提示及时做好晚疫病防控；无预测预报条件，于封垄期采用代森锰锌、丙森锌等药剂喷施预防晚疫病，若发现中心病株及时喷施克露、增威赢绿、氰霜唑、银法利等治疗性药剂（1-2）次。结合晚疫病防治喷施1—2次吡虫啉防治蚜虫。设施栽培及时通风降温。出苗后，根据天气早揭晚盖，棚内气温白天保持在18-22℃，夜间保持在12-15℃。通风需循序渐进，先从两头通风，再慢慢打开中间棚膜通风，到日平均温度在15℃时，完全撤去棚膜。（宋波涛）

[下载本文pdf文件](/pdf/1304-马铃薯春季田管技术 这些方法掌握住.pdf)