


造成母牛流产的五大原因养殖户注意规避

导读：正常情况下一头母牛一年只能产一头牛犊，有些母牛因产后长时间不发情等，两年都不能产一头牛犊，有些母牛还会出现流产问题，这些情况下势必对养牛效益造成影响，这些原因中，母牛流产是可以避免，只要加强防范。而要想防范好，我们就要了解母牛流产的原因，下面一起来了解下。

正常情况下一头母牛一年只能产一头牛犊，有些母牛因产后长时间不发情等，两年都不能产一头牛犊，有些母牛还会出现流产问题，这些情况下势必对养牛效益造成影响，这些原因中，母牛流产是可以避免，只要加强防范。而要想防范好，我们就要了解母牛流产的原因，下面一起来了解下。




1、碰撞流产

妊娠母牛相互抵撞，或者是剧烈运动后会受到一些惊吓，或者是外力造成的流产，都是称为机械性流产。而对于这类流产要从管理方面入手，可以对妊娠母牛拴养或采用小栏散放饲养，不要大群饲养，避免相互顶撞造成流产。

2、营养不良

当母牛饲养管理条件差，母牛膘情较差，营养摄入难以满足胎儿的生长，这种情况下母牛便容易出现流产，另外母牛缺乏硒、维生素E等微量元素、维生素的情况下亦容易出现流产。因此母牛进入妊娠前期按照空怀期的营养标准饲喂，妊娠中后期则要适当增加营养供给，同时注意多喂一些青草和补充矿物质、微量元素及维生素等营养成分。



3、霉菌毒素流产

text-indent: 2em; text-align: left;>妊娠母牛长期采食霉变的饲草饲料，体内霉菌毒素累积到一定量之后也会出现流产。饲草饲料一定要加强存放，以免出现霉变，当饲料出现霉变后一律禁止喂牛。</p>

4、酸性流产</p>

<p style=text-indent: 2em; text-align: left;>母牛长期、大量采食青贮玉米秸秆、酒糟、豆腐渣等酸性较大或含酒精的饲料，容易出现流产、弱犊或死胎的现象。妊娠母牛应禁止饲喂酒糟、豆腐渣，青贮玉米秸秆可在添加碳酸氢钠等缓冲剂的情况下少量饲喂，一般不建议超过粗饲料总量的20%。</p>

5、药物性流产</p>

<p style=text-indent: 2em; text-align: left;>有些药物或者疫苗已经明确标注孕牛不可以用，或者是没有按照说明以及兽医指导的使用，这些现象也会出现流产的问题。当母牛患病需要治疗或需要进行防疫时，一定要严格按照药物说明或兽医师指导进行用药，同时在抓牛、打针的过程中动作一定要轻缓。</p>

<p style=text-align: center;></p>

<p style=text-indent: 2em; text-align: left;>除了这些外，还有很多因素可以导致母牛流产，但常见的还是这些原因，为了有效保证母牛安全产下小牛，我们在饲养时一定要注意以上这些事项，有效避免母牛出现流产问题。</p>

<p></p><p>下载本文pdf文件</p>